

DEO OPTIMO MAXIMO UNI ET TRINO, VIRGINI DEIPARÆ
ET SANCTO LUÆ. ORTHODOXORUM MEDICORUM PATRONO.
QUÆSTIO MEDICA.

CARDINALITIIS DISPUTATIONIBUS MANE DISCUTIENDA

IN SCHOLIS MEDICORUM, DIE JOVIS XXV. FEBRUARII MDCCXVII.

M. JOANNE-CLAUDIO-ADRIANO HELVETIUS, Medico Regis ordinario, è Regiâ Scientiarum Academiâ, Doctore Medico, Præside.

An largiorem semper exigit Kinakina cibum?

VITA est jugis cum morte colluctatio. Tantus fit indefinenter partium corporis tum fluidarum tum solidarum effluxus, ut brevi corrumpitur esset corpus, nisi aliunde jactura hæc refarciretur. Ideo providentiâ naturæ exci-
sim indicant, sed hæc omnia simul juncta certiore regulam sufficiunt. Error cavebitur si naturarum, substantiæ, qualitatis alimentorum, temporis & ordinis assumendorum maxima habeatur ratio. Hoc effectum à vero non pro-
sus abluat: *omnia sana sanis*; modo copiâ non peccetur, aut non repugnet frustra sollicitatis stomachus. Attamen qui, luxuriâ potius quam necessitate ductus, nullis sese legibus obligat, quantumvis sit firmâ valetudine, seriis oculis
intemperantiæ penam luet. At præfentiora & graviora impendunt agris mala, si accurata diætæ norma non servetur: in victu enim peccatum sæpius frangit salutaria naturæ morborum medicatricis conamina, atque remedium
morbos debellaturorum vires infringit. Utinam liceret omnimodâ abstinentiâ morbos aggredi, brevi rediret sanitas, sed votum est, non artis præceptum: Vidorum enim inanitiones ad summum perducunt periculosa. Hippocr. aphor. 3.
sect. 1. Igitur danda alimenta, eâ tamen adhibita moderatione, ut dum vires fulcire animus est, morbus ejusque causa non adaugeantur, neque remedia suo preventur successu. Vix aliâ de causâ in febribus intermittentibus saluber-
rime antidotus frequentissimè spem Medicorum fallit, quàm quod post singulas ejus doses vulgi præjudicii obsequendo cibus oggeratur largior.

FEBRES intermittentes gignit fermentum quoddam acidum, non modò è primis viis manans, sed è sanguinis sinu præsertim scaturiens. Illius vi sanguinem primò densari indicant harum febrium prodromi, pulsus parvus, fri-
gidæ partes, pallida cutis, unguis labiaque livida, fidem faciunt horrores, quos excitat serum è sanguine expressum & membranas vellicas. Hæc sanguinis densatio rectè deducitur ab humoribus acidis, crudis & indigestis,
quorum scaturiginem ab alvo repedant esse indices sunt nausæ, ructus, vomitus, borborygmi, ventris tensio incipiente paroxysmo, atque etiam hujus citior invasio, si paulo antè cyathus frigida propinetur. Idem suadet curatio,
quæ vulgò absorbentibus, amaris aut etiam catharticis perficitur. Verùm inspissatus sanguis repetito circuitionis motu iteratè quæ partium oscillatione attenuatur, explicantur partes sulphureæ, evolvuntur salia, eoque major fermenta-
tio exurgit, quò sunt copiosiores idoneæ ad fermentandum particule, calor urens nascitur, sanguis turget & coarctatur in angustioribus vasibus, unde dolores partium, somnus, deliria, motus convulsivi. Hæc molestiarum plena
symptomata post aliquot horas, quasi finita tragedia, evanescunt, recursura tempore suo. Sed unde novæ accessiones? Querenda causa in sanguine, febrile scilicet fermentum quod in cruoris sinu aliquandiu, placidum quidem, sed
non innoxium, reconducitur. Hoc turbantur liquores, fluidum è glandulis ventriculi stillans depravatur, bilis, succus pancreaticus, eodem velut aurâ contagiosè afflati, hanc chylo communicant. Jam depravato chylo crescit fermentum
febrile, amplius exaggeratur assumptis tunc alimentis copiosioribus. Multiplicati fermenti particule tenuiores evolvuntur proximæ accessiones auctores. Quæ verò crassiores sunt, latent sopita, donec stato temporis in-
tervallo evolutæ novum generent paroxysmum, si quolibet die, febrem quotidianam: si alternis diebus, tertianam si interpositis duobus, quartanam daturæ. Ut amplius non fiat rediiva febris, idonea adhibeantur remedia, con-
gruens præscribatur diætâ, junctis ambo viribus rem conficiant. Efficacia solius remedii nimium credere fallax est, neglecto enim victu scopum non attingent remedia etiam potentiora.

INTER auxilia domando febrili fermento idonea ceteris palmam præripit cortex Peruvianus. Parte terrestris absorbet eò potentiùs acida febrilia in primis viis contenta, quò accuratior est illius poros inter & particulas hujus fer-
menti proportio: crudas adhuc evolvit, evolutas sic absorbet, ut mixtæ cum sanguine jam non valeant ipsius motus perturbare. Non minùs efficaciter agit in fermentum febrile sanguini permixtus, alio quàm ore commeatu,
ut fidem faciunt enemata ex decocto Kinakinae scilicet præscripta, parte enim salis volatili & sulphureâ motum augeat, attenuat, dividitque liquores crassiores, extricat heterogenea & ad exitum disponit, unde nonnunquam primo
usu catharsim movet, urinas pellit, sed præcipua ejus virtus est diaphoreticam excitare, quò sensim sine sensu eliminantur fermenta sanguinis febrilia. Itam vim Kinakinae diaphoreticam ostendunt tum ejus sapor, tum omnia quæ
post ejus usum apparent phenomena. Is sapor amarus est, partes sulphureas carpit, liquores crassiores dividit ætenuatque, & non secus ac alia ejusdem saporis remedia fluiditatem sanguinis tuetur; illius ope lactis acorem anteverti
experientia demonstrat, sal volatile, quo turget, in eo vim arguit diaphoreticam. Idem ostendit ab illius usu pulsus ægrorum frequentior, etiam die intermissionis febrium tertianarum, cutis admodum humida & mollis, nocturnus
sudor atque uberior ægrorum calor. Si Kinakina paroxysmum proximè sequentem non cohibeat, hic nonnunquam est solito intensior, & undequaque effluit sudor non antè visus. Ubi immodicus est illius usus, de calore conque-
runtur ægri, præsertim in pectore, humor per pulmones exhalans (par est enim Diaphoresis pulmonum atque cutis) salis eos vellicat & quasi urit, unde tussis sicca, vel ubertim generatus glandulas ingurgitat & distendit, atque
ita comprimuntur vasa sanguinea, moras necit sanguis, hinc calor intensior difficiliorque respiratio. Ægrorum Kinakinae ope ad sanitatem tendentium vegetior est appetitus, quod liquoris in ventriculo depluentis salia magis
esse evoluta significat, solito minor est ad somnum propensio. Quidquid immodicus Kinakinae usus inflammations nonnunquam excitat. Hæc omnia vehementiore fermentationis motu sanguinem cieri manifestè significant. Fer-
menta febrilia ligari cortice dissuadent memorata symptomata, quin & sapor amarus. Recurrit nonnunquam post aliquot hebdomadas febris? Accusandus parior medicamenti usus, vel error circa res non naturales, alimenta im-
primis, aut æris temperies austriana & pluviosa: tunc enim diaphoresis segnior occlusis meatibus cutis. Post aliquot menses revertitur? Causa est eadem quæ primò intulit. Commentum est fingere fermentum febrile à corticis
compedibus solutum.

IMPURA corpora quò plùs nutritis, eò magis læseris, Hippocr. aphor. 9. sect. 2. Ne ergo nimius sis in præscribenda diætâ ægrorum febrè intermittente laborantium. Ingesti copiosius cibi Kinakinae efficacitatem plurimum
infringunt, illorum nonnisi imperfecta est coctio. Fermentum febrile in primis viis luxurians, suam ipsis conferre indolem. Sicque hujus augeatur potentia, & multiplicatur acidum. Chylo crudiore & acidiore sanguis incrassatur.
Febrilium fermentorum proventus est uberior, eaque tenaciùs irriuntur & vix per glandulas cito possunt eliminari. Ita vim medicamenti eludunt, ut incerta aut tardior admodum evadat curatio. Ne tamen omnibus ægris ci-
bus interdicatur; iis convenit tantum tenuis diætâ, quibus inter paroxysmos non intermissio, sed remissio solùm est. In his nihilominus convenit Kinakina, modò bellè vacuatum sit corpus, & purgatione ita remissio lon-
gior, si secus factum, brevior: eadem instituenda diætâ in febre tertiana duplici. Breve enim est temporis spatium inter paroxysmos, quod nec jultam medicamenti quantitatem, nec uberius alimentum admittit: est tamen in istis
febris, ubi aliqua ciborum necessitas incumbit: cum nempe Kinakina intestinorum canalem præterlabitur æquo citius, cortex enim sincerus intestinis commissus pungit citatque magis alvum, inde inutile remedium: è contrâ
alimentis consociatus tardè descendit, humores crudos morando mitigat, atque commodè per lactea subeundo sanguinem suâ tincturâ imbut, sed longè tutius res peragitur, si cortici opii momentum adjiciatur. Hæc mixturâ non
modò intestinorum sensus imminuit, sed Kinakinae adaugetur vis diaphoretica: eodem suffamine uti licet in tertianis & quartanis, ubi salina sanguinis crasis est, ubi fervidior facile spumat, tunc Kinakinae solius copulâ acue-
retur magis atque incitaretur. Hæc indulgentia multa præcaventur incommoda, fibrarum nimia contractio, pororum restrictio, incitator sanguinis motus, fecernendorum suppressa translatio, calor augmentum, atque febris in-
tensior. In febribus tertianis aut quartanis nihil vetat alimenta solida concedi; ea enim est inter paroxysmos intermissio, ut sufficiens Kinakinae copia possit præscribi, quâ chyli vitium emendetur, & fermenta febrilia extin-
guantur. Ne tamen quorumlibet ciborum usus permittatur, eligendi concocti faciliores. Hos tamen inter singulas doses non sit semper religio præscribere, ubi non appetit stomachus, nec de calore conqueruntur ægri. Plurices
antidoto uti licet non assumptis cibis, dum scilicet nihil indicat sanguinem vehementiore motu cieri, saliaque magis extricari, cum cibi non sint ad vim Kinakinae augendam, sed ad frenandam utiles.

IMMERITO culpatur parior diætâ, ubi est Kinakina inefficax, vel ab illius usu deteriora fiunt morbi symptomata. Mali causa est ut plurimum imprudens remedii exhibitio; si continens sit febris, nullâ notatâ remissione, aut
exacerbationis distinctâ vicissitudine, si intermittens, sed maligna, si redudent in sanguine pravi humores; si sanguis sicciore fervidiorque sit, aut partibus tenuioribus spoliatus, si quæ pars obstruente, inflammatione aut abs-
cessu tentetur, à Kinakina abstinendum. In febribus enim continuis jam vehementior intestinus sanguinis motus, cortice exhibitio, concitatur adhuc, illiusque acceleratur circuitus, unde humores præterlabuntur cutis spiracu-
la. Quotquot in sanguine continentur diversi liquores, inordinato motu exagitat poros glandularum non subeunt, unde calor adaugetur, morbusque ingravescit. In febribus intermittentibus malignis tanta est humorum co-
pia, tantuque organum, ut non possint solius corticis ope eliminari. Citius recurreret paroxysmus, eoque fieret intensior, quò partes humorum magis fuissent evolutæ usu remedii, cuius partes volatiliores sanguinem tunc com-
moverent vehementer. Tutius est hæc febres aggredi venæ sectionibus, emeticis, & catharticis; sedato organo, in usu erit Kinakina cum purgantibus mixta. Dum enim hæc humores vitiosos è sanguine per glandulas intestinorum
educunt, cortex absorbet cruda & acida in primas vias depluentia. Sed antequam præscribatur, diligenter attendendum, ne pulsus sit durus, lingua arida, cutis urens, aut viscerum inflammatio. Cum sanguis sicciore est & servi-
dior, aut partibus tenuibus spoliatus, Kinakina non præscribatur; nam tunc usu febrifugi expelluntur volatilia, sanguis terrestris & adultus remanet, excrementitii humores sunt crassiores, quàm ut per cola fecerri queant;
unde obstruções, cachexia, icterus, hydrops, tabes. Priùs ergo sanguis fluidus reddatur remediis ac præcipuè victu idoneo. Si, quæ causæ febrem acciverunt, simul liquores densaverint & obstruções genuerint, quæ aliquan-
do per tempus latent, non tutus est tunc solius corticis usus. Excitatur enim motus in sanguine, quò tenuiora avolant, remanent crassiora, obstruçõesque sunt pertinaciores. Minor febrifugi dosis tunc exhibenda, ut absorbeat fermen-
ta in primis viis stabulantia, aut imminuantur paroxysmi, qui obstruções fovent, sed ne spes fit morbum profigandum esse, ni advocetur in usum aperientia remedia, quæ concretos humores solvant, adjunctis catharticis quæ
solutos evacuent. Sublatis obstruções, si vigeat etiamnum febris, tunc largiore febrifugi usu debellanda. Sed si quæ à fermento febrili nondum extincto, aut ab intempestivo Kinakinae usu, exurgunt incommoda, emendare ni-
tatur Medicus exhibitis uberius cibis, malum malo addit. In quibus enim febribus cortex convenit, ni intervalla sint longiora, symptomataque minora, solidis uti alimentis periculo non vacat. Hæc enim obtundunt vim, quâ pol-
ler, acida absorbendi, virtutem illius diaphoreticam infringunt, sit novus fermentorum febrilium proventus; unde morbus contumaciore.

Ergo largiorem non exigit semper Kinakina cibum.

Proponebat Parisiis EMMANUEL-MAURITIUS DUVERNEY Parisinus, Baccalaureus Medicus. A.R. S.H. 1717. à sextâ ad meridiem.

M.P.
PARISIENSIS